

# Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Radek Poláček

[gynekologie@nemorako.cz](mailto:gynekologie@nemorako.cz)

STG22/2016

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM

### Chirurgická léčba vulvární dysplasie

#### Vážená paní,

vzhledem k tomu, že se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informována.

Na základě klinického a histologického vyšetření byl u Vás zjištěn přednádorový stav na zevních rodidlech nebo v pochvě a byla Vám doporučena chirurgická léčba. Chtěli bychom Vám poskytnout informace o plánované operaci, aby jste mohla s doporučovaným postupem vyslovit souhlas.

#### Co je excize:

Excize je odstranění chorobně změněné tkáně s ochranným lemem. To znamená, že se odstraní chorobně změněná část zevních rodidel nebo pochvy s okrají, které tvoří již zdravá tkáň.

**Alternativy výkonu:** Tato operace nemá alternativu.

#### Jaký je režim pacientky před výkonem:

Po dobu minimálně 6 hodin před operací nemůžete přijímat tekutiny, stravu a kouřit. Večer před operací je někdy zapotřebí vyprázdnění střev pomocí projímadel a nálevu. O anestézii Vás bude informovat lékař anesteziolog, který Vám může předepsat podání různých tlumících a zklidňujících léků v rámci předoperační přípravy.

#### Jaký je postup při provádění výkonu:

Samotná operace bude provedena z řezu na zevních rodidlech nebo v pochvě. Následně se provede oddělení postižené tkáně od okolí. Na závěr se řez na zevních rodidlech nebo v pochvě sešije vstřebatelným stehem.

#### Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Popisovaných komplikací u operace není mnoho. Může dojít k většímu žilnímu krvácení nebo poranění močové trubice, močového měchýře nebo střeva. Poranění močové trubice a močového měchýře je nutno ošetřit a následně odvádět moč hadičkou, která je zavedena do močového měchýře. Poranění střeva je nutné ošetřit a může si vyžádat našití přechodného nebo trvalého vývodu na přední stěnu břišní. Doba hospitalizace se potom prodlužuje na 10-14 dní. Také v pooperačním období může dojít ke komplikacím. Hojení operační rány může být komplikováno infekcí se zhoršeným hojením rány, nutností podávání antibiotik eventuálně opětovného sešití operační rány. Četnost všech těchto komplikací se pohybuje do 5%.

#### Jaký je režim pacientky po provedení výkonu:

Bezprostředně po operaci budete při nekomplikovaném průběhu 2 hodiny monitorována na jednotce intenzivní péče a poté budete přeložena na standardní oddělení. Na standardním lůžkovém oddělení

# Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

---

můžete ihned chodit, jíst a pít. Běžná doba hospitalizace trvá 3 dny. Pracovní neschopnost po propuštění z nemocnice není nutná.

## **Vážená paní,**

naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (eventuálně operátora) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá. **Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.**

**PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !**

Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Jméno pacientky:.....

Rodné č.:.....

Vysvětlující pohovor provedl: .....Razítko a podpis lékaře

**Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího provedení, a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.**

V Rakovníku dne.....

..... podpis pacientky