

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

RADIOGIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Viktor Fuchs

rdg@nemorako.cz

STRDG 2/2023

INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A PROVEDENÍM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

NITROŽILNÍ PODÁNÍ JODOVÉ KONTRASTNÍ LÁTKY

Vážený paciente, vážená pacientko,

byl/a jste indikován/a k diagnostickému vyšetření, pro které je nutné nitrožilní podání kontrastní látky. Před tímto zdravotním výkonem budete ošetřujícím lékařem informován/a o zamýšleném výkonu, možnostech postupu, možných komplikacích, rizicích a ev. následcích.

Tento materiál by Vám měl podat potřebné informace o tomto zdravotním výkonu, případně další podrobnosti Vám sdělí na základě Vašeho dotazu lékař.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM VÝKONU (ÚČEL, POVAHA)

Při některých speciálních rentgenových vyšetřeních a při většině CT vyšetření je třeba do krevního oběhu podat roztok jodové kontrastní látky. Tato látka způsobí přechodně rozdílnou průchodnost rentgenového záření jednotlivými tkáněmi a orgány a umožní podrobnější zobrazení. Tato látka se dále vylučuje ledvinami a močovými cestami, což umožňuje dobré zobrazení těchto orgánů.

VLASTNÍ PROVEDENÍ VÝKONU

Roztok kontrastní látky aplikuje lékař nebo střední zdravotnický personál pod přímým dohledem lékaře. Podání se provádí injekcí do žíly, nejčastěji na horní končetině, je však možno látku podávat do jakékoliv přístupné žíly. Látka se vstříkuje ručně nebo speciálním mechanickým injektorem. Množství kontrastní látky a rychlost vstříkávání závisí na konkrétním typu vyšetření, nejčastěji se podává 1 – 2 ml na kilogram hmotnosti pacienta. Jakékoliv obtíže, které by se objevily během podání kontrastní látky a během vyšetření, hlase okamžitě přítomnému zdravotnickému personálu, který Vás bude během celého vyšetření nepřetržitě sledovat.

MOŽNÉ KOMPLIKACE VÝKONU

I při zcela správném provedení celého výkonu může dojít následkem tohoto vyšetření k mírnějším nebo i vážným komplikacím. Konkrétní riziko závisí především na individuální vnímavosti pacienta, na jeho zdravotním stavu a na typu použité kontrastní látky. Menší krvácení ze žíly nebo podání kontrastní látky pod kůži mimo žílu není nebezpečné a obvykle nevyžaduje zvláštní léčbu, i když někdy může být nepříjemné či bolestivé a může zanechat modřinu. Během podávání kontrastní látky do žíly nebo i později bývají poměrně často pocíťovány příjemné pocity mírného tepla nebo návalu. Tyto pocity nejsou nebezpečné a nejde o komplikace. Někdy se po podání kontrastní látky do krevního oběhu může projevit tzv. reakce na kontrastní látku. Reakce může mít různé projevy a různou závažnost – mírná nevolnost, zvracení, kopřivka či jiné kožní projevy, křeče, náhlá dušnost,

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

prudký pokles krevního tlaku až těžké reakce se ztrátou vědomí. Stav může být až život ohrožující. Těžké reakce jsou vzácné, lehké projevy jsou poměrně časté. Léčba komplikací závisí na charakteru reakce. **Pokud jste již v minulosti po podání jodové kontrastní látky nějakou reakci měl/a, hlase tuto skutečnost indikujícímu lékaři i lékaři provádějícímu vyšetření.** Zvýšené riziko vzniku nežádoucích reakcí je u dětí, starších lidí nad 60 let, alergiků, diabetiků, u pacientů s poškozenou funkcí ledvin, u osob s předchozí reakcí na kontrastní látku. Závažnost reakce závisí též na použité kontrastní látce. U všech rizikových pacientů používáme speciální, velmi dobře snášené kontrastní látky, tudíž je riziko závažných reakcí výrazně sníženo.

Vzhledem k tlumivému účinku požadovaného protialergického léku Dithiaden doporučujeme všem pacientům zajistit si doprovod k vyšetření. Lék způsobuje stavy, které vylučují řízení motorového vozidla.

MOŽNÁ OMEZENÍ V OBVYKLÉM ZPŮSOBU ŽIVOTA A V PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Pokud je vyšetření prováděno ambulantně, neodcházejte po dobu nejméně 20 minut z Radiodiagnostického oddělení. Pokud jste hospitalizován na lůžkovém oddělení nemocnice, budete odveden nebo odvezen nemocničním personálem. Při výskytu jakýchkoliv obtíží po provedeném vyšetření hlase vše okamžitě zdravotnickému personálu.

POUČENÍ O ALTERNATIVÁCH NAVRŽENÉHO VÝKONU

S ohledem na charakter konkrétního navrhovaného zdravotního výkonu poučí lékař pacienta o možných alternativách výkonu, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích.

PŘED PODPÍSEM INFORMOVANÉHO SOUHLASU SE PROSÍM ZEPTEJTE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Jméno pacienta:.....

Rodné č.:.....

Poučení poskytl a případné doplňující informace zodpověděl:

(Razítko a podpis lékaře)

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod zdravotního výkonu, způsob jeho provedení, a byl/a jsem obeznámen/a s možnými riziky a komplikacemi navržených zdravotních výkonů a jejich alternativ. Byl/a jsem také poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli. Prohlašuji, že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s uvedenými zdravotními službami a výkony.

V Rakovníku dne.....

.....

Podpis pacienta